

ETUDE REPEVIH-1.

L'identification des facteurs de risques de virose chronique (VIH, VHB, VHC) est-elle possible en consultation de médecine générale ?

A. Aim-Eusébi⁽¹⁾, E. Prothon⁽¹⁾, C. Majerholc⁽¹⁾, Y. Yazdanpanah⁽²⁾, JP. Aubert⁽¹⁾
(1) Département de Médecine Générale, Université Paris-Diderot
(2) Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Bichat

Introduction.

Le nombre de personnes s'ignorant séropositives pour le VIH, VHB ou VHC est important en France. Certaines questions, notamment sur l'orientation sexuelle, sont considérées comme difficiles à poser systématiquement. Notre étude a comparé auto-questionnaire et interrogatoire ciblé du patient par le médecin généraliste dans le but de dépister les facteurs de risques.

Méthodes.

Les 18 généralistes parisiens participants étaient randomisés en deux groupes et ont interrogé ou remis un auto-questionnaire aux 50 premiers patients, de 18 à 65 ans, venant seuls en consultation.

Au total, 842 patients ont été inclus, 349 dans le groupe auto-questionnaire (A) et 493 dans le groupe interrogatoire ciblé (B).

Le critère de jugement principal était l'acceptabilité, définie par le taux de réponse des patients.

Résultats.

L'acceptabilité globale de notre questionnaire était de 88,48%, dans le groupe A de 93,12% et dans le groupe B de 85,19% (p<0,05).

Le motif de non-réponse le plus fréquent (36,08%) était la non-proposition des questions (41,10% dans le groupe B et 20,83% dans le groupe A).

La prévalence des facteurs de risques était de 51,81%.

A l'exclusion des patients pour lesquels un résultat de dépistage était connu, **les taux d'intention de prescription d'une sérologie dans la population à risque étaient de 56,10% pour le VIH, 31,76% pour le VHB et 29,91% pour le VHC.**

Dix médecins sur 18 ont ressenti une gêne pour poser les questions proposées, tandis que 12 sur 18 ont déclaré vouloir changer leurs pratiques à l'issue de l'intervention.

Conclusion.

Les méthodes de recueil de données, auto-questionnaire et interrogatoire ciblé, sont acceptables et efficaces pour l'identification des facteurs de risques de viroses chroniques, dont la prévalence est élevée.

Les intentions de dépistage par les médecins dans la population à risque sont insuffisantes. Le frein principal à l'abord de la sexualité vient des médecins, non des patients.

La sensibilisation des médecins au dépistage des viroses chroniques s'impose au-delà même de l'identification des facteurs de risques chez leurs patients.

Questionnaire patient

Mode de vie

- 1) Sexe : homme femme 2) Age : ___ ans 3) Pays de naissance : _____
- 4) Avez-vous des tatouages ou des piercings? Oui Non
- 5) Avez-vous eu une transfusion sanguine avant 1992 ? Oui Non
- 6) Ces 12 derniers mois, vous est-il arrivé de boire de l'alcool jusqu'à l'ivresse ? Oui Non
- 7) Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé des drogues? Oui Non
- 7.1) Si oui : lesquelles ? Cannabis Poppers Ecstasy Amphétamines MDMA
 LSD Crack Cocaine Héroïne GHB
 Autre drogue : _____
- 7.2) Si oui : en avez-vous déjà pris en injection intraveineuse ? Oui Non
- 8) Au cours de votre vie, avez-vous eu une infection transmise sexuellement ou par le sang ? Oui Non
- 8.1) Si oui, lesquelles ? Infection à gonocoque ou chlamydia Herpès génital Syphilis
 Papillomavirus VIH Hépatite B Hépatite C Autre: _____

Votre vie sexuelle

- 9) Actuellement, avez-vous un partenaire sexuel régulier ? Oui Non
- 9.1) Si oui, il s'agit... d'une femme d'un homme
- 9.2) Si oui, utilisez-vous des préservatifs avec ce partenaire ?
 Toujours Souvent Rarement Jamais
- 10) Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu d'autres partenaires sexuels ?
 Oui, un seul Oui, plusieurs Non
- 10.1) Si oui, il d'agissait... de femme(s) d'homme(s) les deux
- 10.2) Si oui, avez-vous utilisé des préservatifs avec ce(s) partenaire(s)?
 Toujours Souvent Rarement Jamais

Le VIH, les hépatites et vous

- 11) Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec une personne séropositive pour le VIH ? Oui Non
- 12) Dans votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage pour le VIH ? Oui Non
- 12.1) Si oui : De quand date le dernier test ? < 6 mois 6 à 12 mois 1 à 4 ans 5 ans ou plus
- 13) Dans votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage pour l'hépatite B ? Oui Non
- 14) Dans votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage pour l'hépatite C ? Oui Non

Acceptabilité et efficacité de l'intervention en fonction des données antérieurement connues et des antécédents de dépistage pour le VIH

