

Le repérage des facteurs de risque de virose chronique (VIH, VHB, VHC) améliore-t-il leur dépistage en médecine générale ?

E. Prothon⁽¹⁾, A. Aïm-Eusébi⁽¹⁾, C. Majerholc⁽¹⁾, Y. Yazdanpanah⁽²⁾, J.-P. Aubert⁽¹⁾

(1) Département de Médecine Générale, Université Paris-Diderot

(2) Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Bichat

Objectifs.

Un grand nombre de personnes s'ignorent séropositives pour le VIH, le VHB ou le VHC en France. Notre objectif était d'évaluer l'impact d'un repérage systématique des facteurs de risque sur l'activité de dépistage des médecins généralistes.

Méthodes.

Notre étude observationnelle s'est déroulée à Paris en 2014. Les 18 généralistes participants devaient inclure les 50 premiers patients, de 18 à 65 ans, venant seuls en consultation.

Les patients devaient répondre à un questionnaire (Tableau 1) rempli soit par le patient lui-même, soit par son médecin au cours de l'interrogatoire. Les médecins étaient libres de proposer ou non un dépistage du VIH, du VHB et/ou du VHC.

Le critère de jugement principal était le nombre moyen de sérologies remboursées par l'Assurance maladie par médecin pendant une période de 4 semaines après le début de l'intervention, comparé à la même période, un an auparavant.

Résultats.

842 patients ont été inclus.

Le nombre moyen de sérologies par médecin dans les quatre semaines après le début de l'intervention était de 4,39 pour le VIH, 3,67 pour le VHB et 3,39 pour le VHC. Par rapport à l'année précédente, il a augmenté de 27 % pour le VIH ($p=0,22$), 113 % pour le VHB ($p=0,005$) et 135 % pour le VHC ($p=0,005$) (Tableau 2).

Tableau 2. Nombre moyen de sérologies réalisées par médecin pendant 4 semaines

	Avant	Après	Évolution	p
VIH	3,44	4,39	+ 27 %	0,22
VHB	1,72	3,67	+ 113 %	0,005
VHC	1,44	3,39	+ 135 %	0,005

Selon les virus, un dépistage était indiqué (présence d'un facteur de risque ou absence d'antécédent de dépistage) pour 61 à 71 % des patients inclus (Figure 1).

Parmi les patients pour lesquels un test était indiqué, 69 à 75 % n'ont pas eu de proposition de test par leur médecin, 5 à 7 % ont refusé la prescription, 12 à 14 % ont reçu une prescription mais ne l'ont pas fait et seulement 7 à 10 % ont réalisé le test en laboratoire (Figure 2).

Conclusion.

Le repérage systématique des facteurs de risque de viroses chroniques augmente l'activité de dépistage des hépatites B et C de façon statistiquement significative, mais n'a pas d'effet significatif sur le volume de dépistage du VIH. Ces résultats soulignent le besoin de formations ciblées pour les médecins généralistes afin d'améliorer les pratiques de dépistage.

Tableau 1. Questionnaire patient

Sexe :	<input type="checkbox"/> homme	<input type="checkbox"/> femme	Âge :	_____ ans
Pays de naissance : _____				
Avez-vous des tatouages ou des piercings ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Avez-vous eu une transfusion sanguine avant 1992 ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé des drogues ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Si oui : lesquelles ? <input type="checkbox"/> Cannabis <input type="checkbox"/> Poppers <input type="checkbox"/> Ecstasy <input type="checkbox"/> Amphétamines <input type="checkbox"/> MDMA <input type="checkbox"/> LSD <input type="checkbox"/> Crack <input type="checkbox"/> Cocaïne <input type="checkbox"/> Héroïne <input type="checkbox"/> GHB <input type="checkbox"/> Autre : _____				
Si oui : en avez-vous déjà pris en injection intraveineuse ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Avez-vous déjà eu une infection transmise sexuellement ou par le sang ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Si oui, lesquelles ? <input type="checkbox"/> Infection à gonocoque ou chlamydia <input type="checkbox"/> Herpès génital <input type="checkbox"/> Syphilis <input type="checkbox"/> Papillomavirus <input type="checkbox"/> VIH <input type="checkbox"/> Hépatite B <input type="checkbox"/> Hépatite C <input type="checkbox"/> Autre : _____				
Actuellement, avez-vous un partenaire sexuel régulier ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Si oui, il s'agit... <input type="checkbox"/> d'une femme <input type="checkbox"/> d'un homme				
Si oui, utilisez-vous des préservatifs avec ce partenaire ? <input type="checkbox"/> Toujours <input type="checkbox"/> Souvent <input type="checkbox"/> Rarement <input type="checkbox"/> Jamais				
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu d'autres partenaires sexuels ? <input type="checkbox"/> Oui, un seul <input type="checkbox"/> Oui, plusieurs <input type="checkbox"/> Non				
Si oui, il s'agissait... <input type="checkbox"/> de femme(s) <input type="checkbox"/> d'homme(s) <input type="checkbox"/> les deux				
Si oui, avez-vous utilisé des préservatifs avec ce(s) partenaire(s) ? <input type="checkbox"/> Toujours <input type="checkbox"/> Souvent <input type="checkbox"/> Rarement <input type="checkbox"/> Jamais				
Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec une personne séropositive pour le VIH ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
Dans votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage pour... ... le VIH ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non ... l'hépatite B ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non ... l'hépatite C ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				




Figure 2. Réalisation du test et motifs de non-réalisation parmi les patients pour lesquels un dépistage était indiqué

